

Среди хирономид преобладали *Chironomus plumosus*, *Procladius Skuse* и *Polypedilum gr. nubeculosum*. Численность хирономид составила 521 экз./м² (53,1 %), их биомасса – 2,48 г/м² (42,7 %). Также были высоки численность и биомасса олигохет и личинок мокрецов (табл. 5). Группу «прочие» составили пиявки, личинки ручейников и поденок.

Таблица 5 – Показатели развития зообентоса водохранилища Заславское

Группы организмов	Численность		Биомасса	
	тыс.экз./м ²	%	г/м ²	%
Хирономиды	521	53,1	2,48	42,7
Олигохеты	268	27,3	1,45	25,0
Мокрецы	124	12,6	1,02	17,5
Прочие	68	7,0	0,86	14,8
Всего	981	100	5,81	100
Дрейссена	264		198	

Моллюски были представлены исключительно дрейссеной, при этом её биомасса очень велика – 198 г/м². Но поскольку она практически не потребляется рыбами (как правило, из аборигенных видов только крупная плотва питается молодыми моллюсками), мы ее учитывали отдельно.

Общая численность и биомасса зообентоса исследуемого водоема (без дрейссены) составляют 981 экз./м² и 5,81 г/м² соответственно, что может характеризовать водохранилище Заславское по показателям развития бентоса как водоем выше средней кормности /5/.

Анализ всех составляющих позволяет охарактеризовать водохранилище Заславское по степени развития кормовой базы как эвтрофный, слабозарастающий водоем выше средней кормности.

5. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЫБ, ОБИТАЮЩИЕ В ВОДОЕМЕ

По имеющимся сведениям на момент обследования в водоёме насчитывается 20 видов рыб (табл. 6). Из них четыре вида интродуцированы (в табл. 6 выделены курсивом) – карп (сазан), сом, белый амур и карась серебряный. Видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь (2004 г.), в водоеме не отмечено. Из инвазийных видов отмечен бычок-песочник.