

Таблица 6 – Виды рыб, обитающие в водохранилище Заславское

№ п/п	Вид рыбы	№ п/п	Вид рыбы
1	щука	11	щиповка
2	судак	12	окунь
3	лещ	13	ёрш обыкновенный
4	плотва	14	налим
5	линь	15	бычок-песочник
6	<i>карась серебряный</i>	16	<i>сом</i>
7	<i>капн (сазан)</i>	17	верховка
8	пескарь	18	<i>амур белый</i>
9	голец	19	горчак
10	укляя	20	колюшка трехиглая

На основании морфометрических, гидробиологических характеристик, видового состава рыб водохранилище Заславское в соответствии с рыбохозяйственной классификацией относится к водоёмам лещево-судачьего класса.

6. ЗИМОВКА РЫБЫ, МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НЕРЕСТИЛИЩ

Ярко выраженных мест зимних скоплений (зимовальных ям) на водохранилище Заславское нет. Рыба зимует на значительной площади водоема. Половозрелая плотва концентрируется на глубинах в 3-5 м, тогда как ее молодь в районе водосброса и в местах впадения рек и ручьев. Лещ практически всех возрастов придерживается бывшего русла с глубинами 5-8 м. Щука распределяется более-менее равномерно по всему водоему, предпочитая закоряженные места. Судак придерживается участков с твердым дном, особенно на литоральном склоне с перепадами глубин.

Основные нерестилища фитофильных видов рыб (лещ, плотва, щука и др.) располагаются в прибрежной зоне мелководных заливов и возле островов (рис. 2). Площадь нерестилищ достаточно ограничена, особенно для такого вида как щука. При стабильном уровне воды в период нереста (конец марта - май) состояние нерестилищ вполне удовлетворительное. В годы же с большой сработкой уровня воды в этот период, может происходить массовая гибель икры и молоди рыбы.

Нерестилища судака располагаются на глубинах 1-3 м, в местах с песчаным и галечным грунтом (рис. 2). Состояние их вполне удовлетворительное. Наибольшее влияние на успех размножения этого вида в данном водоеме имеют погодные условия, так как в случае сильного волнения икра механически повреждается и заиливается, что негативно сказывается на ее развитии.